



18.10.2016

Przewódki coraz bardziej popularne

Jesienne susze panujące w Polsce w ostatnich latach utrudniają, a w niektórych rejonach wręcz uniemożliwiają wysiew zbóż ozimych w optymalnym dla nich terminie. Ponadto wielu rolników uprawia kukurydzę na ziarno, po zbiorze której za późno jest już na zasiew zbóż ozimych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest uprawa odmian przewódkowych. Są to odmiany zbóż jarych, które można wysiewać zarówno wiosną, jak i w okresie późnojesiennym (koniec października, początek listopada) lub zimowym (koniec stycznia, luty). Przewódki posiadają gen zimotrwałości, który nabyły w wyniku krzyżowania form jarych z ozimymi, a który umożliwia im przetrwanie zimy. Jarowizacja tych odmian odbywa się przez kilka tygodni w temperaturze bliskiej 0°C. Odmiany przewódkowe powinno się wysiewać w dodatnich temperaturach, a ich normę wysiewu należy zwiększyć o około 20-25%, w porównaniu do siewu w okresie wiosennym. Dojrzewają w tym samym czasie co formy ozime, dzięki czemu pole można przeznaczyć pod zasiew rzepaku ozimego lub międzyplonów. Nawozy.eu / PORADY EKSPERTÓW – dr inż. Małgorzata Haliniarz